

Naam van de patiënt

U wordtdag d.d. om uur

op de röntgenafdeling verwacht.

Prunacolon® + helder vloeistofdieet.

De dag voor het onderzoek :

Ontbijt : Normaal
12 uur 's middags: 1 heldere gelatine pudding of 1 glas limonade
1 uur 's middags: 1 glas helder vruchtensap of limonade
2 uur 's middags: 1 glas helder vruchtensap of limonade
3 uur 's middags: Neem met de weegschaal uw lichaamsgewicht op.
Neem zoveel ml **Prunacolon®** als overeenkomt met uw gewicht in kg
(b.v. 50 kg lichaamsgewicht = 50 ml **Prunacolon®**).
Neem echter nooit méér dan 75 ml
(b.v. 90 kg lichaamsgewicht = 75 ml **Prunacolon®**).
4 uur 's middags: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water
5 uur 's middags: 1 heldere gelatine pudding of gefiltreerde bouillon en 1 glas helder sap of water
6 uur 's avonds: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water
7 uur 's avonds: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water
8 uur 's avonds: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water
9 uur 's avonds: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water
10 uur 's avonds: 1 glas helder vruchtensap of limonade of water

TOEGESTANE DRANKEN :

appelsap Gefiltreerd :
druivensap sinaasappelsap
bessensap bouillon
roosvicee
limonadesiroop
koffie/thee (met weinig suiker)

NIET TOEGESTAAN :

Alle koolzuurhoudende dranken
De dag van het onderzoek:
Geen ontbijt, alleen twee glazen vruchtensap.

N.B. :

Diabetes Mellitus patiënten moeten rekening houden met het suikergehalte (sacharose) van **Prunacolon®**:
0,65 gram per ml.
Bij gebruik van **Prunacolon®** kan een onschuldige verkleuring van de urine optreden.

Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

Prunacolon®, siroop



Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om PRUNACOLON zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is PRUNACOLON en waarvoor wordt het ingenomen?
2. Wat u moet weten voordat u PRUNACOLON inneemt.
3. Hoe wordt PRUNACOLON ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u PRUNACOLON?

PRUNACOLON, siroop

- De werkzame bestanddelen zijn sennavruucht 400 mg/5 ml en dexpanthenol 5 mg/5 ml.
- Andere bestanddelen zijn methylparahydroxybenzoesuur, kaliumsorbaat, pruimenextract, glycerol, sucrose en water.

Registratiehouder :

Nycomed bv
Postbus 31
2130 AA Hoofddorp
NEDERLAND

Fabrikant :

Nycomed Christiaens
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel
BELGIË

In het register ingeschreven onder RVG 10259=02218

I. WAT IS PRUNACOLON EN WAARVOOR WORDT HET INGENOMEN?

Farmaceutische vorm en inhoud

Siroop.
Fles van 75 ml.

Geneesmiddelengroep

PRUNACOLON is een middel dat de stoelgang bevordert.

Te gebruiken

- bij verstopping (constipatie/obstipatie)
- voor het ledigen van de darm als voorbereiding van een röntgenonderzoek (X-stralen) van de buikholte.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PRUNACOLON INNEEMT

Gebruik PRUNACOLON niet:

- wanneer u last heeft van plotseling optredende buikpijn
- bij ontstekingen van de darm

- bij verstopping van de darm
- wanneer u overgevoelig bent voor het actief bestanddeel (antrachinonglycosiden)

Wees extra voorzichtig met PRUNACOLON

- wanneer u suikerziekte heeft, omdat PRUNACOLON 0,65 gram suiker bevat per ml. Een rode verkleuring van de urine kan optreden na gebruik van PRUNACOLON.
- PRUNACOLON niet langdurig gebruiken zonder de arts te raadplegen
- wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) of aan nierfalen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

PRUNACOLON kan, voor zover bekend zonder bezwaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Antrachinonen, de actieve stoffen in de PRUNACOLON siroop, gaan bij gebruik van hoge doses over in de moedermelk en kunnen diarree bij de zuigeling veroorzaken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van PRUNACOLON

PRUNACOLON bevat onder andere als hulpstof glycerol, sucrose (of sacharose, suiker) en kaliumsorbaat.

Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat 65 g sucrose per 100 ml. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis van 8 tot 15 ml 5,2 gram tot 9,75 gram sucrose. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie, glucose-galactose, malabsorptie syndroom, of sucrase-isomaltase deficiëntie. Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat kalium. Kalium kan schadelijk zijn bij een kaliumbeperkt dieet. Te veel kalium kan na orale toediening maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Methylparahydroxybenzoaten kunnen vertraagde allergische reacties, zoals contactdermatitis, veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen.

Gebruik van PRUNACOLON in combinatie met andere geneesmiddelen

Het kaliumverlies veroorzaakt door andere geneesmiddelen (bijv. diuretica, waterverdrijvende middelen) kan worden versterkt. Bij langdurig gebruik kan de werking van hartglycosiden (middelen voor het hart) worden versterkt door het optreden van kaliumverlies.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. HOE WORDT PRUNACOLON GEBRUIKT?

Bij verstopping : Volwassenen 8-15 ml (1 dessertlepel tot 1 eetlepel) per dag. Kinderen vanaf 6 jaar 6-8 ml (2 theelepels tot 1 dessertlepel) per dag. De dagdosis wordt bij voorkeur in één keer ingenomen, b.v. 's avonds bij het naar bed gaan of 's morgens voor het ontbijt.

Daar de gevoeligheid van de darm grote individuele verschillen vertoont, is het raadzaam na te gaan, vooral wanneer met de behandeling begonnen wordt, welke dosis de beste werking heeft. Bij een zeer moeilijke stoelgang dient men de dosis iets verhogen; in het tegenovergestelde geval moet ze verlaagd worden, ten einde te voorkomen dat de laxerende werking sterker zou zijn dan gewenst is.

Bij reiniging van de darm vóór röntgenonderzoek : de dosering is 1 ml PRUNACOLON per kg lichaamsgewicht met een maximum van 75 ml.

Wijze van toediening : op de dag vóór het onderzoek dient de lunch te bestaan uit een heldere gelatinepudding of 1 glas limonade. Vervolgens ieder uur een glas helder vruchtensap of water.

Om 3 uur 's middags wordt de voorgeschreven hoeveelheid PRUNACOLON ingenomen en een glas water. Om 5 uur 's middags een heldere gelatinepudding of 1 glas water. Vervolgens tot 10 uur 's avonds ieder uur een glas helder vruchtensap of water. Op de dag van het onderzoek is geen ontbijt toegestaan, alleen twee glazen helder vruchtensap of water.

In geval u bemerkt dat PRUNACOLON te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van PRUNACOLON heeft ingenomen :

Bij het innemen van te grote hoeveelheden, kunnen diarree, buikpijn en neiging tot bewustzijnsverlies voorkomen.

Wanneer u te veel van PRUNACOLON heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Indien nodig mag een anti-diarree product worden ingenomen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan PRUNACOLON bijwerkingen veroorzaken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden :

Meteorismus, buikkrampe, misselijkheid, braken, collaps.

Langdurig gebruik kan leiden tot waterige diarree met overmatig verlies van water en elektrolyten (vooral kalium), spierzwakte, gewichtsverlies, albuminurie, beschadiging van de plexus myentericus, pigmentering van het colonslijmvlies (melanosis coli).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiters is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PRUNACOLON?

PRUNACOLON buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25° C. Bewaren in de originele verpakking.

Uiterste gebruiksdatum:

Gebruik PRUNACOLON niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na."

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd op: 8 juni 2004

Laatste gedeeltelijke herziening:

December 2007