



Bijsluiter bestemd voor de patiënt

ALGEMENE KENMERKEN



Benaming

ZINOLIUM ACICLOVIR 50 mg/g crème

Samenstelling

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème bevat per gram aciclovir 50 mg – PEG-5-glycerol stearaat – dimeticon – cetylalcohol – vloeibare paraffine – witte vaseline – propyleenglycol – water.

Farmaceutische vorm en inhoud

Crème voor uitwendig gebruik op de lippen.
Tubes van 3 g.

Geneesmiddelengroep

Middel tegen koortslip.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen

Nycomed bv
Postbus 31
2130AA Hoofddorp
Tel.: (023)- 5668700

In het register ingeschreven

RVG 23765

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème is aangewezen voor de behandeling van koortslip.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Gevallen waarin het geneesmiddel niet mag worden gebruikt

Overgevoeligheid voor aciclovir of voor één van de bestanddelen van de crème.

Nodige voorzorgen bij gebruik

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème mag niet aangebracht worden op de slijmvliezen, zoals in de mond. Contact met de ogen vermijden.
Bij patiënten met ernstig verminderde weerstand is het raadzaam om vóór gebruik uw arts te raadplegen, de arts dient namelijk een afweging te maken of u beter met aciclovir in de vorm van tabletten kan worden behandeld.


Zwangerschap en borstvoeding

Voorzichtigheid is aangewezen bij gebruik van aciclovir tijdens de zwangerschap en de lactatie. Aciclovir mag in deze periodes dan ook alleen op uitdrukkelijk voorschrift van een arts worden gebruikt.



Besturen van voertuigen en gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen. Een nadelig effect op deze activiteiten is echter niet waarschijnlijk.





Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Er zijn geen wisselwerkingen bekend.



AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering

De crème vijf maal daags met tussenpozen van ongeveer 4 uur aanbrengen gedurende vijf dagen. In geval van onvolledige genezing mag de behandeling verlengd worden tot tien dagen.

Wijze van gebruik

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème moet worden aangebracht op de letsels zodra deze zich vormen. Zo mogelijk de behandeling starten zodra de voortekenen zich manifesteren zoals een pijnlijke of gevoelige lip, jeuk of een brandend gevoel.

Wat te doen als veel meer is ingenomen dan is voorgeschreven

Ongewenste effecten na bijvoorbeeld inname van 10 gram ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g crème (500 mg aciclovir) zijn niet aannemelijk. Raadpleeg uw arts indien er crème is ingenomen of indien u veel meer crème heeft gebruikt dan in deze bijsluiter is aangegeven.

Wat te doen als een dosis vergeten is

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g vooralsnog zo snel mogelijk aanbrengen als U vergat de crème te gebruiken op het geplande uur. Daarna de crème zoals gebruikelijk aanbrengen, d.t. ongeveer om de vier uur, 5 maal daags.

BIJWERKINGEN

Na aanbrengen van ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g kan een korte tijd een branderig of stekend gevoel optreden. Bij een klein aantal gebruikers is melding gemaakt van uitdrogen en/of schilferen van de huid. Tevens is bij een klein aantal gebruikers melding gemaakt van roodheid van de huid en jeuk. Ook is in enkele gevallen melding gemaakt van ontsteking van de huid op de plaats waar de crème werd aangebracht (contact dermatitis). Deze overgevoeligheidsreactie kan zich voordoen bij mensen die overgevoelig zijn voor één van de bestanddelen van het product. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN EN UITERSTE GEBRUIKSTERMIJN

Er zijn geen speciale bewaarinstructies.

ZINOLIUM Aciclovir 50 mg/g mag niet gebruikt worden na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld na „Exp” (Exp: maand/jaar). Als vervaldatum geldt de eerste dag van de aangegeven maand.

DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEEN

30 december 2007.