

Leest u deze informatie regelmatig door, ook wanneer u Nedios al vaker heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Samenstelling

Werkzame stof:

Een capsule Nedios bevat 250 mg acipimox.

Hulpstoffen

Daarnaast bevat Nedios de volgende hulpstoffen: maiszetmeel, colloidaal silicium, magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat.

De roodbruin/donkerroze gelatine capsule bevat de kleurstoffen ijzeroxide (E172) en titaniumdioxide (E171).

Hoe wordt Nedios afgeleverd?

Nedios capsules zijn verpakt in een doos met 60 capsules in doordrukstrips met elk 10 capsules.

Tot welke groep geneesmiddelen behoort Nedios?

Nedios behoort tot de groep geneesmiddelen die het vetgehalte in het bloed verlaagt.

Wie brengt Nedios in de handel?

Nycomed bv

Postbus 31

2130 AA Hoofddorp

Tel.: (023) 5668777

Inschrijving in het register

Nedios is in het register ingeschreven onder RVG 15314=13159.

Voor wie is Nedios bestemd?

Nedios kan worden gebruikt wanneer het vetgehalte in het bloed te hoog is. Een hoog vetgehalte in het bloed kan schadelijk zijn voor het hart en de bloedvaten.

Het moet eerst worden behandeld met een aangepast dieet (cholesterol- en vetarm) en voldoende

de lichaamsbeweging. Bovendien moet u het gebruik van alcohol staken.

Wanneer al deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, kan Nedios worden toegepast als een hulpmiddel om het vetgehalte in het bloed te verlagen.

Voor wie is Nedios niet bestemd?

Nedios mag niet worden gebruikt door patiënten met:

- een maagzweer
- een ernstige nierziekte
- een overgevoeligheid voor bestanddelen van Nedios

Waar moet u op letten bij het gebruik van Nedios?

Tijdens de behandeling zal uw arts het vetgehalte in het bloed en ook de werking van de lever regelmatig controleren. Indien u lijdt aan jicht of leverziekten, dient u dit aan uw arts mede te delen, omdat Nedios dit kan verergeren. In ernstige gevallen kunt u Nedios beter niet gebruiken.

Indien u lijdt aan suikerziekte, moet u er rekening mee houden dat de dosering insuline mogelijk moet worden verlaagd.

Nedios samen met andere geneesmiddelen of alcohol

Indien u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vertelt u dit dan aan uw arts.

Alcohol heeft een ongunstig effect op het vetgehalte in het bloed. Gebruik daarom geen alcohol.

Gebruik tijdens zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Nedios kan beter niet worden gebruikt tijdens

het geven van borstvoeding, omdat het geneesmiddel in de moedermelk overgaat.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Nedios op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Aanwijzingen voor het gebruik

De arts of de apotheker heeft u verteld hoeveel capsules u per dag moet innemen en op welke tijdstippen. Dit staat ook op het etiket van de apotheek. Houdt u zich strikt aan deze aanwijzingen.

Gebruikelijke dosering:

De therapie wordt meestal gestart met 2 maal per dag 1 capsule (na het ontbijt en na het avondeten). Indien noodzakelijk kan de dosis worden verhoogd tot 3 maal per dag 1 capsule (na de maaltijden).

Afwijkende dosering:

Bij bejaarden is de dosis 1 maal per dag 1 capsule. Bovendien zal de arts de nierfunctie controleren. Bij patiënten met verminderde nierfunctie is de dosis 1 maal per dag 1 capsule. Bij vrij sterk verminderde nierfunctie is de dosis 1 capsule om de 2 dagen.

Welke bijwerkingen kan Nedios geven?

Tijdens de behandeling met Nedios kunnen de bloedvaten zich verwijden, waardoor een rode kleur, een warmtegevoel, en/of hoofdpijn ontstaat. Ook zijn stoornissen van de spijsvertering, misselijkheid en/of buikpijn waargenomen. Raadpleeg uw arts als de klachten langere tijd aanhouden.

Overgevoeligheid voor bestanddelen van Nedios kan voorkomen. Hierdoor kan huiduitslag en jeuk ontstaan en heel soms een plotselinge, plaatselijke vochtophoping van b.v. de huid of de keel, of bewustzijnsverlies.

Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden, die hierboven niet zijn genoemd.

Aanwijzingen voor bewaring en houdbaarheid

Nedios kan in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking

en op de doordrukstrip vermeld achter de aanduiding „niet te gebruiken na“. De eerste cijfers geven de maand aan; de laatste cijfers het jaartal. De verpakking buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Datum laatste herziening van de bijsluiter

September 2007.

Voor nadere informatie over Nedios kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

© Nycomed bv